**SZPITAL POWIATOWY w Golubiu-Dobrzyniu**
**MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE**
**CENNIK (obowiązuje od 01.05.2026)**

| Lp. | Nazwa badania | cena w zł | czas oczekiwania na wynik ( dni robocze) |
|---|---|---|---|
| **MIKROBIOLOGIA** | | | |
| | | | |
| 1. | Posiew moczu* | **30,00** | **2-4** |
| 2. | Posiew wymazu* | **40,00** | **3-5** |
| 3. | Posiew nasienia* | **40,00** | **3-5** |
| 4. | Posiew plwociny i innych materiałów z dróg oddechowych (popłuczyny oskrzelowe, treść oskrzelowa, BAL, aspiraty) * | **50,00** | **3-5** |
| 5. | Posiew kału - badanie ogólne (w tym badanie w kierunku grzybów)* | **40,00** | **3-5** |
| 6. | Posiew kału w kierunku *Salmonella spp., Shigiella spp., Yersinia spp.* * | **40,00** | **3-5** |
| 7. | Posiew krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych materiałów z jam ciała – butelka tlenowa | **40,00** | **5-8** |
| 8. | Posiew krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych materiałów z jam ciała – butelka beztlenowa | **40,00** | **5-8** |
| 9. | Posiew końcówki cewnika naczyniowego – metoda ilościowa | **30,00** | **3-5** |
| 10. | Posiew w kierunku bakterii beztlenowych (na kopertę) | **60,00** | **5-10** |
| 11. | Wymazy dochodzenia epidemiologicznego* | **30,00** | **3-5** |
| 12. | Wykrywanie GBS (*Streptococcus agalactiae* ) w materiale z dróg rodnych | **35,00** | **3-5** |
| 13. | Biocenoza pochwy | **30,00** | **1** |
| 14. | Badanie wykrywające nużeńca (rzęsy, łuski skórne) | **40,00** | **1** |
| 15. | Antybiogram podstawowy | **25,00** | **—** |
| 16. | Antybiogram MIC (1 antybiotyk - metoda E-test) | **30,00** | **—** |
| 17. | Antybiogram MIC - dla kolistyny (metoda mikrorozcieńczeń w bulionie) | **60,00** | **—** |
| 18. | Identyfikacja poszerzona o wykrywanie mechanizmów oporności drobnoustrojów i/lub dodatkowe testy biochemiczne – metoda konwencjonalna | **40,00** | **—** |
| 19. | Identyfikacja drobnoustrojów na panelach biochemicznych wraz z antybiogramem - metoda automatyczna | **50,00** | **—** |
| 20. | Badanie mikrobiologiczne powierzchni – metoda odciskowa i wymaz * | **30,00** | **—** |
| 21. | Badanie mikrobiologiczne powietrza – metoda sedymentacji* | **30,00** | **—** |
| 22. | Kontrola mikrobiologiczna sterylizatorów – Sporal S (test dostarczony przez zlecającego) – 1 test | **25,00** | **—** |
| 23. | Test na wykrywanie EPEC w kale | **35,00** | **3** |
| | | | |

**SZPITAL POWIATOWY w Golubiu-Dobrzyniu**
**MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE**
**CENNIK (obowiązuje od 01.05.2026)**

| Lp. | Nazwa badania | cena w zł | czas oczekiwania na wynik ( dni robocze) |
|---|---|---|---|
| 24. | Test na obecność antygenu *Chlamydia trachomatis* w wymazie i moczu (metoda immunochromatograficzna) | **40,00** | **1** |
| 25. | Test na obecnośc antygenu *Streptococcus pneumoniae/Legionella pneumophila* w moczu (metoda immunochromatograficzna) | **40,00** | **1** |
| 26. | Test na obecność antygenu *Rotavirus/Adenovirus* w kale (metoda immunochromatograficzna) | **35,00** | **1** |
| 27. | Test na obecność antygenu *Norovirus* w kale (metoda immunochromatograficzna) | **50,00** | **1** |
| 28. | Test na obecność GDH - *C. difficile* w kale (metoda immunochromatograficzna) | **40,00** | **1** |
| 29. | Test na obecność GDH i Toksyn A/B - *C. difficile* w kale (metoda immunoenzymatyczna) | **80,00** | **1** |
| 30. | Test na obecność antygenu *Campylobacter spp.* w kale (metoda immunochromatograficzna) | **35,00** | **1** |
| 31. | Test na obecność antygenu - *Grypa A i B (metoda immunochromatograficzna)* | **35,00** | **1** |
| 32. | Test na obecnośc antygenu - *RSV* (metoda immunochromatograficzna) | **40,00** | **1** |
| 33. | Test na obecność antygenu – *Sars CoV-2* (metoda immunochromatograficzna) | **35,00** | **1** |
| 34. | Test na obecność antygenu - *Streptococcus pyogenes* - STREP A (metoda immunochromatograficzna) | **35,00** | **1** |
| 35. | Test na obecnośc antygenu *Sars-CoV-2, grypy A i B, RSV* (COMBO) (metoda immunochromatograficzna) | **40,00** | **1** |
| 36. | Posiew w kierunku *Mycobacterium tuberculosis* (metoda klasyczna + preparat) | **120,00** | **10 tyg** |
| 37. | Posiew w kierunku *Mycobacterium tuberculosis* (MGIT + metoda klasyczna) | **180,00** | **5-10 tyg.** |
| 38. | Posiew w kierunku M. tuberculosis (metoda molekularna + MGIT + metoda klasyczna) | **460,00** | **—** |
| | | | |
| | | | |
| | *posiew materiału na podłoża mikrobiologiczne metodą konwencjonalną z podstawową identyfikacją drobnoustrojów bez antybiogramu | | |
| | ** wymaz z gardła, nosa, oka, ucha, pochwy, cewki moczowej, odbytu, rany itd. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |